

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL

Abate Fetel

Tamaño: Grande.

Forma: Calabaciforme alargada. Cuello largo, más o menos acentuado, generalmente apuntado hacia el pedúnculo. Muy asimétrica. Contorno irregularmente redondeado o levemente ondulado.

Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial. **Pedúnculo:** Corto o medio. Grosor medio, ligeramente engrosado en su extremo, a veces total o parcialmente carnoso y más grueso. Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente oblicuo, a veces como prolongación del fruto.

Cavidad del ojo: Anchura media. Poca o mediana profundidad. Bordes ondulados. **Ojo:** Mediano, abierto. Sépalos grandes, carnosos, rojizos; erectos generalmente con las puntas partidas quedando la base, que es unida.

Piel: Fina, poco brillante. **Color:** Amarillo verdoso pasando a amarillo dorado. Punteado ruginoso de tamaño variable, muy perceptible. Zona ruginosa cobriza en la parte superior del cuello, como derramándose desde el pedúnculo, ligera maraña fina por el resto del fruto y ruginosidad más basta en la cavidad del ojo.

Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy ancho y corto.

Corazón: Pequeño, mal delimitado. Muy próximo al ojo. Eje cerrado. Celdillas ovales muy próximas al eje. Con frecuencia solo cuatro carpelos.

Semillas: Medianas, alargadas. Con o sin espolón. Color castaño rojizo no uniforme. Con frecuencia abortadas.

Carne: Blanco amarillenta. Fundente, jugosa. **Sabor:** Aromático. Estupendo.

Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

